植 物 分 类 学 报 29 (3): 268—269 (1991)
Acta Phytotaxonomica Sinica

同钟花属(桔梗科)一新种

洪德元　　马黎明
(中国科学院植物研究所系统与进化植物学开放研究实验室　北京 100093)

A NEW SPECIES OF THE GENUS *HOMOCODON* (CAMPANULACEAE) FROM SICHUAN, CHINA

HONG DE-YUAN　MA LI-MING
(*Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany, and Herbarium, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100093)

Key words *Homocodon*; *H. pedicellatus*
关键词 同钟花属; 长梗同钟花

长梗同钟花 新种 图 1

Homocodon pedicellatum Hong et L. M. Ma, sp. nov.

Species nova *H. brevipedi* (Hemsl.) Hong affinis, sed a quo floribus magnis, pedicellatis, pedicellis c. 6 mm longis, stylo valde exserto differt.

Herbae annuae repentes. Caules graciles, glabri vel pro parte majore valde sparsim pilosi, longitudinaliter 3-alati, ramulis inflorescentiae 1—3-floriferis axillaribus abbreviatis. secus eos principales. Folia caulina alterna, flabelliformia, 4—9 mm longa, 3—12 mm lata, margine dentata, petiolis 2—4 mm longis; folia ramulorum inflorescentiarum axillarium foliis caulibus manifeste minora. Flores 1—3, ex axillis foliorum ramulorum inflorescentiae abbreviatarum orti, pedicellati, pedicellis c. 6 mm longis. Calyx epigynus, tubo obconico, c. 1.5 longo, lobis triangularibus, c. 2mm longis, latere anguste l-dentatis. Corolla caerulea, tubulato-campanulata, 7—9mm longa, ad medium fissa, lobis oblongis. Antherae teretes, c. 2mm longae filamentis c. 4.5mm longis. Stylus valde exsertus, apice 3-lobatus, lobis linearibus, per anthesin revolutis.

四川 (Sichuan): 泸定 (Luding), 贡嘎山东坡 (east slope of the Gongga Mountain), 海螺沟 (Hailuogou), 1400-1600m. 1982. 07.12. Lang Kai-yong, Li Liang-qian and Fei Yong 569 (Typus, PE).

一年生匍匐草本, 茎细长, 无毛或被极稀疏的毛, 有 3 条纵翅, 主茎叶腋间有极短的分枝, 其上有几片叶子。叶互生, 具 2—4mm 的叶柄, 叶片扇形, 长 4—9mm, 宽 3—12mm,

1987. 07. 08 收稿。

边缘具牙齿，主茎上的叶明显大于小枝上的叶。花生于极缩短的分枝的叶腋中，每个分枝



图1　长梗同钟花 *Homocodon pedicellatus*　1.植株 plant; 2.花 flower; 3.花枝 flowering branch; 4.茎一段 apart of stem.

具 1—3 朵花，花明显具梗，梗长可达 6mm；花萼上位，筒部倒圆锥状，长约 1.5mm，裂片 5 枚，三角形，长约 2mm，每侧边缘具一狭长齿；花冠蓝色，管状钟形，长 7—9mm，深裂最大至 1／2 处，裂片 5 枚，长圆形；花丝长约 4.5mm，花药长约 2mm，柱状；花柱明显伸出花冠，柱头三裂，裂片条形，在花期反卷。花期 7 月。种子未见。